

बीजप्रक्रिया

टिप : पावर स्त्रे साठी किटकनाशकाची मात्रा तीन पट करावी.

अ.क्र.	किंड	आर्थिक नुकसान पातळी
०१	नंबाखुवतील पाने खाणारी अळी	१० अळ्या प्रति मिटर ओळीत पीक फुलोऱ्यावर येण्यापूर्वी
०२	केसाळ अळी	१० अळ्या प्रति मिटर ओळीत पीक फुलोऱ्यावर येण्यापूर्वी
०३	कैट अळी	४ अळ्या प्रति मिटर ओळीत पीक फुलोऱ्यावर असतांना, ३ अळ्या प्रति मिटर ओळीत पीक शेगा भरण्याच्या अवस्थेत असतांना
०४	पाने पोखरणारी अळी	सरासरी १०% प्रदुर्भावग्रस्त पाने
०५	चक्रीमुंगा	१५ ते २५% प्रदुर्भावग्रस्त झाडे प्रति मिटर ओळीत
०६	खोडमाजी	१० ते १५% प्रदुर्भावग्रस्त झाडे प्रति मिटर ओळीत

प्रति : १०००

कृषि विज्ञान केंद्र

मराठवाडा शेती सहकार्य मंडळ, खरपुडी, जालना

सोयाबीन पिकातील एकात्मिक कीड व रोग व्यवस्थापन

सोयाबीन हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे प्रमुख नगदी तेलबिया पीक आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी सोयाबीन लागवडी खालील क्षेत्रात वाढ होताता विसृत्त येत आहे. सोयाबीन लागवडी खालीला वाढते क्षेत्र व यातावरण बदलामुळे सोयाबीन पिकावर अनेक किडी व रोगांचा प्रादुर्भाव होऊन पिकाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सोयाबीनचे अपेक्षीत उत्पादन मिळत नाही. महाराष्ट्रात सोयाबीन पिकावर प्रामुख्याने चक्रीभुंगा, खोडमाशी, विविध उंटअळ्या, तंबाखुवरील पानेखाणारी अळी (स्पोडोटेरा इट्टरा), केसाळ अळ्या, घाटेअळी व पाने पोखरणारी अळी तसेच मावा, तुळतुळे, पांढरीमाशी, फुलकिडे इत्यादी रस शोषक किडींचा प्रादुर्भाव आढळून येतो. रोगात प्रामुख्याने शेंगावरील करपा, तांबेरा, बारकोल रॉट व यलो व्हेन मोझॅक व्हायरस इत्यादी रोगांचा प्रादुर्भाव आढळून येतो. या किडी व रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे ३० ते ८० टक्के पर्यंत सोयाबीनचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे सोयाबीन वरील किड व रोगांच्या प्रादुर्भावाबद्दल आपण जागरूक राहणे गरजेचे आहे. ज्यायोगे त्याचे वेळेवर व्यवस्थापन करून होणारे नुकसान कमी करता येईल. त्यादृष्टीने सोयाबीन वरील किडी व रोगाच्या प्रादुर्भावाची लक्षणे व एकात्मिक किड व रोग व्यवस्थापनाबद्दल सविस्तर माहिती दिलेली आहे.

सोयाबीन पिकातील प्रमुख किडी

१) खोडमाशी : खोडमाशीचा प्रादुर्भाव रोप अवस्थेत झाल्यास झाडाचा शेंडा सुकून खाली झुकलेला आढळून येतो. असा शेंडा मधोमध कापल्यास आतमध्ये लहान पिवळी अळी जमिनीच्या बाजूने डोके असलेली म्हणजेच खालच्या दिशेने खोड पोखरत जात असलेली दिसते. रोप अवस्थेत प्रादुर्भाव झाल्यास पूर्णझाड वाळून जाते. झाड मोठे झाल्यास वरून या किडीचा प्रादुर्भाव लक्षात येत नाही त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते.

२) चक्रीभुंगा : या किडीचा प्रादुर्भाव साधारणपणे पीक २० ते २५ दिवसाचे झाल्यानंतर सुरू होतो. चक्रीभुंगाचा प्रादुर्भाव झाले असल्यास झाडाचे एखादे पान किंवा फांदी सुकलेली किंवा वाळलेली आढळून येते. काळजीपूर्वक निरीक्षण केल्यास सुकलेल्या पानांच्या देठावर /फांदीवर दोन सप्तांतर खाचा/खापा छिद्रांच्या स्वरूपात दिसतील. पान फक्त सुकलेले असत तर चक्रीभुंग्याने नुकतेच अंडी दिलेले असते तर पान वाळलेले असले तर काही दिवसांपूर्वी अंडी दिलेले असण्याची तसेच त्यातून लवकरच अळी निघून ती नुकसान सुरू करण्याची शक्यता असते. अळी पानाचे देठ, खोड पोखरून त्याच्या आतील भागावर आपली उपजिवीका करते व पोखरत जमिनीकडे जाते. पूर्णवाड झालेली अळी पिवळी व गोलाकार असते व अळीच्या शरीराचा प्रत्येकभाग जपगाळेतील गण्यासारखा रेंगरेगळा ओळखू येतो. चक्रीभुंग्याने केलेल्या खापेमुळे वरच्या खापेच्या वरील भाग वाळून जातो. चक्रीभुंग्याच्या प्रादुर्भावामुळे शेंगा कमी लागतात व त्या पूर्ण भरत नाहीत.

३) तंबाखुवरील पाने खाणारी अळी : लहान अळ्या सुरुवातीस समुहाने राहतात व पानाचा खातचा भाग खरपडून खातात. त्यामुळे हे पान पातळ पांढऱ्या कागदासारखे किंवा छिडकीच्या तावढासारखे दिसते.



खोड मारी

हुमणी अळी

चक्री भुंगा

मोठ्या अळ्या स्वतंत्रपणे पानांना मोठीछिद्रे पाडून खातात. जास्त प्रादुर्भाव झाल्यास पानांच्या फक्त शिराच शिल्लक राहतात. फुले लागल्यानंतर बऱ्याचदा या अळ्या फुलेसुध्दा खातात. दिवसाल्याचेळी अनेकदा या अळ्या पानाखाली अथवा जमिनीत लपून राहतात व रात्रीच्यावेळी बाहेर पडतात ज्यामुळे त्या दिसत नाहीत.

४) **ऊंट अळ्या :** सोयाबीनवर विविध प्रकारच्या ऊंटअळ्या आढळून येतात. या किडीची अळी लहान, रंगाने फिकट हिरवी असून अतिशय चंचल असते. लहान अळ्या पानाचा खालचा हिरवा भाग खरपडून खातात. त्यामुळे पानाचा फक्त वरचा पांढरा पासुदा दिसतो. अळी मोठी झाल्यावर पानांना छिद्र पाडून खाते. मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाल्यास झाडाची संपूर्ण पाने खाऊन फक्त शिराच शिल्लक ठेवतात. याशिवाय फुले व शेंगा सुध्दा खातात.

५) **घाटे अळी :** अळीचा रंग हिरवट, फिकट पिवळसर, तपकिरी किंवा काळा असतो. अळी सुरुवातीला पाने खाते, कळ्या, फुले व शेंगा लागल्यानंतर ही अळी त्यांना नुकसान पोहचविते. अळीने प्रादुर्भावि्त केलेल्या कळ्या, फुले व कोवळ्या शेंगा खाली जमिनीवर पडतात. मोठ्या शेंगांना अळी मोल छिद्रे पाडुन आतील दाणे खाते.

६) पाने पोखरणारी अळी : अळीचे शरीर हिरवट किंवा तपकिरी व डोके चमकाट काढ्या रंगाचे असते. तर अळीच्या पाठीवर मुलाची रंगाचा ठिपका असतो. अंझ्यातून निघाल्यानंतर सुरुवातीचा जवळपास १ आठवडा पान पोखरतात. त्यामुळे पानावर पांढरट/तपकिरी रंगाच्या वेड्यावाकळ्या रेषा दिसतात. त्यानंतर या अळ्या पानांच्या मूढभागावर येऊन एक कप्पा बनवून त्यात राहतात. सोयाबीनच्या झाडाच्या पानांचा आकार जर टोकाकडे कपा सारखा किंवा पक्ष्याच्या चोवीसारखा झाला असेल तर तेथे पाने पोखरणान्या अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याचे ओळखावे. प्रादुर्भावग्रस्त पाने गुंडाळल्यासारखे दिसतात, सुरुकुलात, सुरुकुलात व वाळून जातात. प्रादुर्भावग्रस्त झाडांच्या शेंगा निट भरत नाहीत व दाणे ही लहान राहतात.

७) हुमणी : सोयाबीन मध्ये हुमणी अळीचा प्रादुर्भाव काही भागामध्ये आढळून येत आहे. हुमणी अळी जमिनीमध्ये राहून झाडाच्या मुळा खाले त्यामुळे झाडे पिवळी पडून वाळतात.

सोंयाबीन वरील रोग

१) **बारकोल रॉट :** या रोगाचा प्रादुर्भाव मॅक्रोफोमिना फेतोसिलिना या दुरशीमुळे होतो. ज्यामुळे कोरड्या मुळा कुजतात किंवा खोड कसतात. या रोगाची लागन सहसा हंगामाच्या सुरुवातीला रोपे ऊंगवण्याच्या आणि वाढीच्या अवस्थेत होतो. पाण्याचा ताण व उच्च तापमान (३० ते ४० डिग्रीसेल्सीअस) या यातावरणात रोगाचे संक्रमण फुल ते शेंगा भरण्याच्या अवस्थेपर्यंत होतो. या रोगामुळे ७७% पर्यंत उत्पादनात घट येऊ शकते. दुरशीचा प्रादुर्भाव मातीतून किंवा बियाण्याद्वारे होतो. रोगग्रस्त झाडाची पाने लहान निघतात, पाने पिवळी होतात, खोडामध्ये हलका रखाडी रंग दिसतो व झाडे वाळून जातात.



तंबाखुवरील पाने खाणारी अळी

घाटे अळी

२) **शेंगावरील करपा :** हा रोग कोलेटोट्रीकम टुंकयाटम या दुरशीमुळे होतो. हा रोग उच्च आद्रता व विर्घकाळ रिमझीम पावसाच्या वेळी तिज्रता वाढते. रोगाचे विजाणू माती, बियाणे आणि पिकांच्या अवशेषामध्ये जगतात. हा रोग रोप अवस्थेपासून शेंगा परीपक्व होईपर्यंतच्या कालावधीत येतो. रोगावरथेत बिजदलावर तपकिरी व काळ्यारंगाचे बट्टे दिसतात. पानांच्या शिराजवळ कोनात्मक तपकिरी ठिपके दिसतात. नंतर हि ठिपके करड्या रंगाचे होऊन त्यांच्या कडा लालसर होतात. कालांतराने रोगग्रस्त पाने करपून गळून पडतात. शेंगा व खोडावर अनियमीत आकाराची लालसर किंवा गडद तपकिरी ठिपके दिसतात आणि अशी अनेक ठिपके एकत्र येऊन शेंगा पिवळ्या पडून करपतात. त्यामुळे शेंगामध्ये दाणे भरत नाही किंवा भरलीच तर ती आकाराने लहान व पोचट उपजतात.

३) **तांबेरा :** हा दुरशीजन्य रोग असून फुलांरा अवस्थेत दिसून येतो. कमी तापमान, जास्त आर्द्रता व सततचा पाऊस वाळकात रोगाचा प्रादुर्भाव वाढतो. पानांच्या खालील मूढभागावर मुख्यशिरजवळ लहान आकाराचे पिवळसर तांबूस ठिपके दिसतात. रोगाची तिज्रता वाढल्यास पानांच्या दोन्ही बाजूस, पानाचे देठ, कोवळे खोड, फांदा इत्यादीवर रोगाची लक्षणे आढळून येतात. रोगग्रस्त झाडाची पाने वाळून गळतात, शेंगातील दाणे बारीक व सुरुकुतलेले होतात.

४) **येलेो व्हेन मोझॅक व्हायरस :** हा विषाणूजन्य रोग असून पांढऱ्या माशीद्वारे या रोगाचा प्रसार होतो. सुरुवातीला कोवळ्या पानावर लहान पिवळे ठिपके दिसतात व नंतर येणाऱ्या पानावर अनियमीत पिवळे आणि हिरवे ठिपके एकमेकांना आलटून-पालटून दिसतात. पानावरील पिवळा रंग हळू-हळू वाढतो आणि नविन तयार झालेली पाने पूर्णपणे पिवळी होऊ लागतात. प्रादुर्भावीत पानावर कुरकुरीतपणा आल्यावे दिसून येते. संक्रमीत झाडे साधारणपणे उभीरा परिपक्व होतात आणि फास्व कमी फुले व शेंगा धारण करतात. शेंगा लहान व विकृत असतात. सुरुवातीच्या संसर्गामुळे बिजोरोपनापुर्वी रोपाचा मृत्यू होतो. संसर्गामुळे बियातील तेलाचे प्रमाण कमी होते.

एकात्मिक किड व रोग व्यवस्थापन

१) जमिनीची मशागत : उन्हाळ्यात जमिनीची खोल नांगरट केल्यास जमिनीत राहणाऱ्या किडी व रोगाच्या अवस्था नष्ट होतील किंवा मूढभागावर येऊन भक्षक पक्षी किंवा प्रखर उन्हाने त्या नष्ट होतील.

२) **किड व रोगास प्रतिकारक वाणाची निवड :** वाणांची निवड करताना जास्त उत्पादनासोबतच किड व रोगास प्रतिकारक्षमता हा गुणधर्म लक्षात घ्यावा. आपल्याभागासाठी ज्या वाणाची शिफारस करण्यात आलेली आहे तेच वाण पेरणीसाठी घ्यावेत.

३) **योग्य वेळेवर पेरणी :** सोयाबीनची पेरणी १५ जून ते १५ जूलै पर्यंत करावी. जून अखेरपर्यंत पेरणी केल्यास खोडमाशीचा प्रादुर्भाव कमी होतो तर जुलैमध्ये पेरणी केल्यास चक्रीभुंग्याचा प्रादुर्भाव कमी होतो. रबी व उन्हाळ्यात सोयाबीनची लागवड केल्याने रोगकाळ जिवणूचा जिवनक्रम चालू राहतो हे मोडण्यासाठी खरीप



येलेो व्हेन मोझॅक व्हायरस

हंगामातच सोयाबीन लागवडीची शिफारस केली आहे. रबी हंगामातील स्वतः उगवलेली रोपे/झाडे काढावीत. पुढील हंगामात पेरणीसाठी बाधित क्षेत्राचे बियाणे वापरणे टाळावे. स्वच्छ निरोगी व रोगमुक्त बियाणे पेरणीसाठी वापरावेत. बोरॉन ०.५ किलो प्रति हेक्टरी सोबत झिक सल्फेट २५ किलो प्रति हेक्टरी सुरुवातीला जमिनीतून दिल्यास बारकोल रॉट या रोगाचा प्रादुर्भाव कमी होतो.

४) **बिजप्रक्रिया :** सोयाबीनमध्ये दुरशीजन्य, जिवणूजन्य आणि विषाणूजन्य रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे रोपाची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होते आणि त्यामुळे उत्पादनात घट येते त्यामुळे बिजप्रक्रिया ही अत्यंत महत्वाची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पेरणीच्या वेळेस प्रिमिक्स दुरशीनाशकाची बिजप्रक्रिया करावी. जसे उदा. अ) थिओफिनेट मिथाईल ४५% + पायरोक्लोस्ट्रोबीन ५% एफएस ३ मि.ली. प्रति किलो बियाणे किंवा कार्बाक्झिन ३७.५ + थायरस ३७.५ (३ ग्रॅम प्रति किलो बियाणे) किंवा पेनरलुफेन + ट्रायफ्लोक्सीस्ट्रोबीन ३८ एफएस १ मि.ली. प्रति किलो बियाणे किंवा अॅझोस्ट्रोबीन २.५% + थिओफिनेट मिथाईल ११.५% + थायोमेथॉक्झॉम २.५% एफएस १० मिली प्रति किलो बियाणे किंवा कार्बेन्डाझीम २.५% + मॅनकोझेब ५०% डब्ल्युएस ३ ग्रॅम प्रति किलो बियाणे किंवा ट्रायकोडर्मा व्हिंरडी ८ ते १० ग्रॅम प्रति किलो बियाणे

ब) दरवर्षी ज्या क्षेत्रात येलेो व्हेन मोझॅक व खोडमाशीचा प्रादुर्भाव असेल त्या शेतकऱ्यांनी थायोमेथॉक्झॉम ३० एफएस १० मिली प्रति किलो बियाणे किंवा इमिडाक्लोप्रिड ४८ एफएस १.२५ मिली प्रति किलो बियाणे या प्रमाणात किटनाशकाची बिजप्रक्रिया करावी.

क) दुरशीनाशक, किटकनाशकची बिजप्रक्रिया झाल्यानंतर जिवणू खताची बिजप्रक्रिया करावी.

५) हुमणीअळी व्यवस्थापनासाठी किटकनाशकांचा वापर : अ) पेरणीनंतर २५ ते ३० दिवसांनी दोन ओळीमध्ये क्लोरोपायरीफॉस (२.५% दाणेवार) १६ किलो प्रति हेक्टरी मातीत मिसळवे. ब) इमिडाक्लोप्रिड ४८ एफएस १.२५ मिली प्रति किलो बियाणे या प्रमाणात बिजप्रक्रिया करून पेरणी करावी.

६) पेरणीसाठी योग्य बियाणे धर : शिफारस केल्याप्रमाणे हेक्टरी ६५ किलो बियाणे वापरावे. बियाणे दाट पेरल्यास किडींच्या वाडीस पोषक वातावरण मिळते.

७) संतुलीत पोषण : शिफारशी प्रमाणे खते द्यावीत, शिफारशी पेक्षा जास्त नसतुकत खते दिल्यास पाने खाणगऱ्या अळ्या व चक्रीभुंग्याचा प्रादुर्भाव वाढतो. पोटॅश सारख्या खताचा वापर केल्यास झाडाची रोगप्रतिकार शक्ती वाढते.

८) प्रादुर्भावग्रस्त पीक नष्ट करणे : केसाळ अळी व तंबाखुवरील पाने खाणारी अळी सुरुवातीला समुदात राहून पाने खातात त्यामुळे प्रादुर्भावग्रस्त पाने किंवा झाडे काढून नष्ट केल्यास अळींचे मोठ्या प्रमाणावर झरत झाडावर होणारे स्थलांतर व नुकसान थांबवता येते. खोडमाशी व चक्रीभुंग्याच्या प्रादुर्भावामुळे रोपाचा शेंडा, पाने, फांदा इत्यादी वाळतात. अशी किडग्रस्त शेंडे, पाने, फांदा यांचा आतीलभाग किडींसह नष्ट करावा.



तांबेरा

ऊंट अळी